

НЕФРОДЕЛ

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Нефродел.

Международное непатентованное название: Золототысячника трава, любистока лекарственного корня, листья розмарина.

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые оболочкой, для приема внутрь.

Состав: Каждая таблетка содержит:

Золототысячника травы.....20 мг;

Любистока лекарственного корня..... 22 мг;

Розмарина листьев..... 25 мг;

Вспомогательные вещества:

Микrokристаллическая целлюлоза.....220 мг;

Цитрат натрия.....5 мг;

Гуммиарабик.....20 мг;

Список ингредиентов: экстракт травы золототысячника, экстракт корня любистока лекарственного, экстракт листьев розмарина, микrokристаллическая целлюлоза, стеарат магния.

Фармако-терапевтическая группа:

Диуретическое средство растительного происхождения. Другие препараты для лечения урологических заболеваний.

Код АТХ: G04BX.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Растительные компоненты лекарства оказывают влияние на систему клубочков и канальцев почек, что позволяет уменьшить выведение белка у пациентов с протеинурией. Средство быстро устраняет неприятные симптомы, выводит из организма лишнюю жидкость, нормализует концентрацию белка в моче и улучшает общее состояние почек и мочевых путей. При почечных коликах оно значительно снижает интенсивность боли, ускоряет отхождение конкрементов и препятствует развитию цистита.

Применение Нефродел приводит к быстрому снижению количества жалоб, связанных с воспалительными заболеваниями эфферентных мочевых путей. Препарат обладает противовоспалительным, спазмолитическим, антиноцицептивным и антибактериальным действием. Нефродел проявляет спазмолитический эффект, анальгетическую активность и нормализует частоту мочеиспускания.

Нефродел уменьшает адгезию уропатогенных бактерий к эпителиальным клеткам мочевого пузыря.

Индивидуальные компоненты Нефродел обладают антибактериальной активностью и оказывают небольшое мочегонное действие, которое поддерживает антибактериальную активность, поскольку бактерии вымываются из мочевых путей.

Данные о канцерогенном потенциале препарата Нефродел отсутствуют.

Экстракт золототысячника травы - одна из классических «горьких трав», обильно произрастающая в дикой природе. Имеет долгую историю традиционного использования в качестве тонизирующего средства для пищеварения. Как трава, он может стимулировать чувство голода и улучшить пищеварение, увеличивая образование желудочного секрета. Экстракт золототысячника обладает мягким противовоспалительным и антимутагенным действием.

Экстракт любистока лекарственного корня используется в качестве «ирригационной терапии» при боли и отеках (воспалении) нижних мочевыводящих путей, для предотвращения образования камней в почках и для увеличения оттока мочи при инфекциях мочевыводящих путей или задержке жидкости.

Экстракт розмарина листьев является богатым источником антиоксидантов и соединений обладающих противовоспалительной активностью, которые, как считается, помогают укрепить иммунную систему и улучшить кровообращение. Розмарин используется для улучшения памяти, расстройства желудка (диспепсии), боли в суставах, связанной с артритом, выпадения волос и других состояний.

Показания для применения:

- острый и хронический цистит;
- в качестве дополнительного средства лечения в специфической терапии пиелонефрита, гломерулонефрита, интерстициального нефрита;
- профилактика образования мочевых камней;
- после операционного удаления мочевых камней;
- нефротический синдром;
- артериальная гипертензия;
- диффузные почечные изменения;
- болезнь Берже;
- расстройства мочеиспускания;
- дискомфортные ощущения при мочеиспускании, жжение и рези при мочеиспускании;
- пузырно-мочеточниковый рефлюкс;
- нефропатия;
- пиелит;
- уrolитиаз различных отделов мочевыводящей системы;
- послеоперационное состояние (связанное с мочевыделительной системой);
- пиелостит;
- уретрит;
- цисталгия;
- уретроцистит.

Способ применения и дозы:

Перед употреблением содержимое флакона необходимо взбалтывать. Препарат принимают внутрь до или после еды. Во время лечения препаратом рекомендуется потребление большого количества жидкости. Стандартная длительность курса лечения препаратом - 21 день. Но после достижения такого эффекта необходимо для стабилизации состояния продолжить прием препарата еще в течение 2-4 недель. Препарат характеризуется хорошей переносимостью и может применяться в комбинации с антибактериальными средствами даже при необходимости длительного применения.

Препарат принимают внутрь, не разжевывая, запивая водой.

Таблетки, покрытые оболочкой:

- взрослым — по 2 таблетке 3 раза в день;

- детям школьного возраста — по 1 таблетке 3 раза в день.

Побочные действия:

- аллергические реакции на компоненты препарата (например, сыпь, зуд);
- желудочно-кишечные расстройства (например, тошнота, рвота, диарея) При первых признаках аллергической реакции необходимо прекратить прием препарата.

Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к любым компонентам препарата, к другим растениям семейства зонтичных (Umbelliferae) (например, анис, фенхель) или к анетолу (компонент эфирных масел);
- язва желудка и двенадцатиперстной кишки в острый период;
- детский возраст до 6 лет;
- отеки вследствие нарушения функции сердца или почек и/или если ограниченное потребление жидкости было рекомендовано врачом;
- недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы.

Лекарственные взаимодействия:

Неизвестны. Возможна комбинация с антибактериальными лекарственными средствами.

Особые указания:

При продолжительной высокой температуре, спазмах, наличии крови в моче, нарушениях мочеиспускания и острой задержке мочи необходимо немедленно проконсультироваться с врачом.

Нефродел содержит глюкозу, сахарозу и лактозу. Пациенты с наследственной непереносимостью фруктозы, галактозы, дефицитом лактазы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы или мальабсорбцией глюкозы/галактозы не должны применять данный препарат.

Применение у больных сахарным диабетом:

Одна таблетка, покрытая оболочкой, содержит приблизительно 0,020 хлебных единиц (ХЕ).

Беременность и лактация:

Нефродел следует принимать во время беременности только по назначению врача, после оценки врачом соотношения пользы-риска от его применения и строго следуя указаниям по его применению. Лекарственное средство не следует принимать женщинам в период грудного вскармливания.

Передозировка: О случаях передозировки не сообщалось. Лечение симптоматическое.

Форма выпуска и упаковка:

По 20 таблеток, покрытых оболочкой, в блистер из фольги алюминиевой и пленки ПВХ/ПВДХ.

По 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта врача.

Произведено для:

MAXX-PHARM.LTD

Лондон, Великобритания