

Проможень

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Проможень

МНН: Куркума, борнеол.

Лекарственная форма: Суппозитории вагинальные.

Состав: Один суппозиторий содержит: Активные вещества:

масло куркумы 82 мг;

борнеол 75 мг;

Вспомогательные вещества: этанол, макрогол 400, макрогол 4000, полиоксил (40) стеарат, лаурокапрам.

Описание: суппозитории желтовато-белого, желтоватого или коричневого цвета, пулеобразной формы.

Фармако-терапевтическая группа: Другие гинекологические препараты.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Масло куркумы и борнеол, входящие в состав препарата являются летучими веществами, в связи с этим проникают глубоко в очаг поражения. Обладая широким спектром антибактериального и противовоспалительного действия, масло куркумы и борнеол увеличивают количество белых кровяных телец в периферическом сосудистом русле, улучшают фагоцитарную активность фагоцитов и иммунитет. Действующие компоненты препарата улучшают циркуляцию крови в области эрозии, удаляют некротические ткани, ускоряют обновление и регенерацию тканей, поврежденных воспалением. Препарат ингибирует и уничтожает опухолевые клетки, но не оказывает воздействия на нормальную ткань.

Применяется против вируса папилломы человека, ингибирует патологический рост ткани.

Активные компоненты препарата подавляют рост и размножение *Candida albicans* и *Torulopsis glabrata*.

Препарат подавляет рост и размножение *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, α -*Streptococcus*, β -*Streptococcus*, *Micrococcus luteus*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus cereus*, *Corynebacterium Vaginale*, *Corynebacterium diphtheroides*, *Bacteroides fragilis*, *Pepto Streptococcus*, *Bacillus typhi*, *Vibrio cholerae*.

Эффективен в отношении возбудителей урогенитального трихомониаза и микоплазма.

Показания к применению:

- эрозия шейки матки;
- цервицит;
- вагинит (в т.ч. грибковый);
- вагиноз (в т.ч. бактериальный);
- старческий кольпит;
- папилломавирусная инфекция;
- с целью подготовки к лечению физическими методами: лазерная терапия, электрокоагуляция, криодеструкция и радиоволновая хирургия.

Противопоказания:

- Девочкам до 14 лет;
- Беременность до 12 недель.

Способ применения и дозы:

Вагинально. Непосредственно перед сном, вымыв руки, в положении лежа, поместить суппозиторий на кончик пальца и ввести глубоко внутрь влагалища (задний свод). Применять по одному суппозиторию на одно применение. Курс лечения составляет 14-15 дней.

При лечении папилломавирусной инфекции необходимо 1–2 курса, в ряде случаев продолжительность лечения составляет 2–3 курса. В случае необходимости курс лечения следует повторить.

Суппозитории можно использовать с целью подготовки к лечению физическими методами, такими как лазерная терапия, электрокоагуляция, криодеструкция и радиоволновая хирургия. При применении препарата уменьшаются осложнения, сокращается время регенерации тканей.

При лечении грибкового кольпита необходимо 1–2 курса лечения. В случае необходимости курс лечения следует повторить.

Лечение бактериального вагиноза должно продолжаться в течение 1–2 курсов, затем, с целью профилактики по 1–2 суппозитория каждую неделю. В случае необходимости курс лечения следует повторить.

Побочные действия:

Редко после введения препарата временно повышается температура тела, появляется чувство жжения, боль, зуд, отек, сыпь и аллергия, у пожилых женщин или пациентов с низким уровнем эстрогенов появляется озноб, в этом случае понижают дозировку или прекращают прием препарата. После прекращения применения препарата эти нежелательные реакции проходят самостоятельно.

Передозировка: не выявлена.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациенты с предрасположенностью к аллергическим реакциям должны использовать препарат с осторожностью. При применении препарата ощущается чувство охлаждения во влагалище.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Нет данных.

Форма выпуска:

Суппозитории вагинальные № 15, с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Произведено для:

MAXX-PHARM LTD.

Лондон, Великобритания